

惠民 優碘軟膏 仿單
W9.5*H19cm

“惠民”優碘軟膏 (普維酮-碘)

BETTER-IODINE OINTMENT “WEI-MING” (POVIDONE IODINE)

許可證字號：衛署藥製字第012377號

【成分】

有效成分及含量：每公克中含 100mg Povidone-iodine，即含 10mg 有效碘 (available iodine)

其他成分(賦形劑)：1. POLYETHYLENE GLYCOL 400
2. POLYETHYLENE GLYCOL 4000
3. GLYCERIN
4. SODIUM BICARBONATE

【用途(適應症)】傷口消毒。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
※曾因本藥成分引起過敏的人。對碘過敏者不能使用。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
(一)有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
(二)三歲以下。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
※兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項：
(一)為防止兒童誤食請妥為保管。
(二)避免陽光直射。
(三)勿超過建議使用量或使用次數。
(四)使用部分或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
(五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
(六)本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
(七)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
(八)本藥有全身性吸收之可能性，因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及哺乳婦有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。
(九)會使皮膚或衣物染色。
(十)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖淨，並立即前往眼科就醫。
(十一)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

【警語】

- ※使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
- (一)若有任何不適情況產生。
 - (二)使用七天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。
 - (三)使用後出現蕁麻疹、浮腫、胸悶等症狀，及臉色蒼白、手脚冰冷、冒冷汗、呼吸困難等現象。


【用法用量】以棉球(棒)沾之塗於患部。

【包裝】1000公克以下鋁軟管裝、塑膠罐裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【保存方式】請貯存於25°C以下，且於期限內使用。

【委託者】

 惠民製藥股份有限公司
台北市中山區吉林路98巷3號

【製造廠】

福元化學製藥股份有限公司
新北市瑞芳區大寮路95-1號